

## Eyacuación retrógrada

Aunque aún se llega al clímax, es posible que la cantidad que se eyacula cuando se sufre de eyacuación retrógrada sea muy poca o que no haya semen. La eyacuación retrógrada no es perjudicial, pero puede causar esterilidad masculina.

### Aquí podrás encontrar

- [Causas de infertilidad](#)
- [Aborto espontáneo](#)
- [Abortos de repetición](#)
- [Alteraciones del moco cervical](#)
- [Aneyacuación](#)
- [Anovulación](#)
- [Astenozoospermia](#)
- [Azoospermia](#)
- [Baja reserva ovárica](#)
- [Criptozoospermia](#)
- [Disfunción eréctil](#)
- [Embarazo a los 40](#)
- [Endometriosis](#)
- [Enfermedades de los ovarios](#)
- [Enfermedades de transmisión sexual e infertilidad](#)
- [Enfermedades del útero](#)
- [Enfermedades en las trompas de Falopio](#)
- [Enfermedades genéticas](#)
- [Eyacuación precoz](#)
- [Eyacuación retardada](#)
- **Eyacuación retrógrada**
- [Hipogonadismo](#)
- [Hipospermia](#)
- [Ligadura de trompas](#)
- [Menopausia precoz](#)
- [Necrospermia](#)
- [Oligospermia](#)
- [Orquitis](#)
- [Síndrome Antifosfolipídico](#)
- [Teratozoospermia](#)
- [Tratamiento del cáncer](#)
- [Varicocele](#)
- [Vasectomía](#)

## ¿Qué es la eyaculación retrógrada?

La **eyaculación retrógrada** se produce cuando el semen entra en la vejiga en vez de salir por la uretra durante la eyaculación. La eyaculación retrógrada es infrecuente. Suele suceder cuando el cuello de la vejiga no se cierra aunque también puede ser causada por algunos medicamentos, diabetes, cirugía de próstata o uretra, etc.

Por lo general, un hombre sano y adulto eyacula la cantidad de una cuchara pequeña de semen en el orgasmo pero en hombres que sufren de eyaculación retrógrada, la cantidad de semen disminuye drásticamente o se produce orgasmo sin semen.

## ¿Puede existir un embarazo con eyaculación retrógrada?

La eyaculación retrógrada es una alteración con graves consecuencias en la [fertilidad](#) masculina. Es complicado que se logre un [embarazo](#) de forma natural, ya que la mayoría de los espermatozoides (o todos) se encuentran en la orina.

Independientemente de que se haya recogido una muestra de semen, se debe recoger la orina después de la masturbación porque es donde se encuentra la mayor parte de espermatozoides. Estos espermatozoides se separan de la orina y se tratan en el laboratorio para poder ser usados en una [técnica de reproducción asistida](#).

## ¿Cómo se puede tratar la eyaculación retrógrada en fertilidad?

En algunos casos, la eyaculación retrógrada necesita de un tratamiento específico para poder dejar a una mujer embarazada pero estos tratamientos dependerán de la causa que lo origine. Algunos de estos tratamientos pueden ser:

- Por efectos secundarios de alguna medicación: el médico puede cambiar la medicación que está causando la eyaculación retrógrada.
- Por problemas leves en los nervios o músculos que afectan a la vejiga: el médico puede recetar algo para mejorar el tono muscular de la abertura de la vejiga. Por problemas severos en los nervios o músculos de la vejiga: se recoge el esperma en la orina y posteriormente se realiza un lavado del mismo para aplicarlo en alguna técnica de reproducción asistida. Las técnicas más usadas son:
  - [Inseminación artificial](#)
  - [Fecundación in Vitro](#)
  - [ICSI](#)

## ¿Qué medicamentos pueden causar eyaculación retrógrada?

Los medicamentos que pueden provocar eyaculación retrógrada pueden ser medicamentos para la depresión y alfabloqueantes (usados para tratar la presión arterial alta y algunas afecciones de la próstata).

## ¿Cómo hacer que el esperma salga con más fuerza?

- Controlar el peso.
- Haz ejercicio.
- Reduce el estrés.
- Dejar de fumar.
- Evitar el alcohol y otras drogas.
- No abusar de ciertos medicamentos.
- Mantener unos niveles adecuados de calcio y vitamina D, etc.

Si necesitas contactar con un especialista en **eyaculación retrógrada**, podemos ayudarte, consulta nuestro listado de [Clínicas de fertilidad en España](#).

## Contenido relacionado

- [Causas de infertilidad](#)
- [Infertilidad](#)